arXiv:0803.4399v2 [math.AG] 17 Mar 2009

Quelques calculs d'espaces $\mathrm{R}^i f_* G$ sur des courbes

Sylvain Maugeais

Résumé

Nous donnons quelques propriétés (nullité, représentabilité, stratification) des espaces $\mathrm{R}^i f_* G$ pour $f : \mathcal{U} \to S$ une courbe affine lisse possédant une compactification lisse et G un groupe résoluble.

1 Introduction

Soit S un schéma, $\mathcal{C} \to S$ une courbe propre et lisse et $\mathcal{U} \subset \mathcal{C}$ le complémentaire d'un diviseur de Cartier horizontale. Notons $f : \mathcal{U} \to S$ le morphisme induit. Pour tout groupe G résoluble, nous calculons les faisceaux $\mathrm{R}^i f_* G$ pour $i \in \{1, 2\}$. Lorsque f est propre, ces faisceaux sont constructibles. Le cas le plus intéressant est donc le cas où $\mathcal{U}$ est affine. D'autre part, si l'ordre de G est inversible sur S alors le calcul est classique et peut se traiter avec des méthodes habituelles (voir le chapitre § 5 pour un exemple). Le premier cas intéressant est donc celui où S est le spectre d'un corps algébriquement clos de caractéristique p divisant l'ordre de G, on a alors $\mathrm{R}^2 f_* G = 0$ et les $\mathrm{R}^1 f_* G$ peuvent être décris comme des limites inductives et faisceaux représentables (cf. [Har80]). Notre but est de généraliser ces résultats dans le cas relatif. En particulier, nous montrons le théorème suivant, qui constitue le coeur de la première partie de cet article

Théorème 1.1 *Soit S un schéma, $\mathcal{C} \to S$ une courbe propre et lisse et $\mathcal{U} \subset \mathcal{C}$ le complémentaire d'un diviseur de Cartier relatif tel que $\mathcal{U} \to S$ soit affine. Notons $f : \mathcal{U} \to S$ le morphisme induit. Pour tout groupe G on a $\mathrm{R}^2 f_* G = 0$.De plus si G est résoluble il existe un épimorphisme pour la topologie étale $\mathcal{T} \to \mathrm{R}^1 f_* G$ où $\mathcal{T}$ est représentable par une limite inductive d'espaces algébriques.*

En particulier, on trouve une généralisation du principe local-global de [Kat86] en la suite exacte

$$0 \to \mathrm{R}^1 h_* G \to \mathrm{R}^1 f_* G \to h_* \mathrm{R}^1 j_* G \to \mathrm{R}^2 h_* G \to 0 \tag{1}$$

Comme h est propre, les termes $\mathrm{R}^i h_* G$ sont assez bien maîtrisés. Il convient donc de mieux comprendre le terme $h_* \mathrm{R}^1 j_* G$.

Ce théorème se démontre par dévissage en se ramenant au cas $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. L'un des problèmes fondamentaux est alors de pouvoir traiter simultanément le cas p inversible ou nul sur S : si p est nul sur S on montre que $\mathrm{R}^2 f_* \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = 0$ en utilisant la suit exacte d'Artin-Schreier, mais si p est inversible c'est une conséquence du théorème de changement de base lisse. L'outil principal utilisé ici est la suite exacte de déformation d'Artin-Schreier à Kummer introduite par

Oort, Sekiguchi et Suwa dans [SOS89]. Le résultat s'obtient alors par une suite de dévissage cohomologique.

Dans le cas où S est le spectre d'un corps, le résultat de[Kat86] (qui correspond à la suite exacte 1 dans le cas où la base est un corps) est particulièrement utile pour construire des revêtements galoisiens de courbes. Le cas de bases plus générales est toutefois beaucoup plus compliqué. Pour l'étudier, nous introduisons une stratification $\coprod_g (\mathrm{R}^1 f_* G)_{\mathfrak{g}=g}$ des espaces $\mathrm{R}^1 f_* G$ et nous montrons que chaque strate est très proche de certains espaces de modules de courbes équivariantes.

Plus précisément étant donné un groupe fini G et deux entiers g et g', considérons l'espace des modules $\mathcal{M}_{g,g'}[G]$ classifiant les courbes propres et lisses de genre g munie d'une action de G fidèle dans chaque fibre, dont le quotient est de genre g'. Notons $n = |G|((2g-2) - |G|(2g'-2))$ et considérons l'espace $\mathcal{M}_{g'}^{[n]}$ qui classifie les courbes propres et lisses de genre g' munie d'un diviseur de Cartier relatif de degré n. En associant à chaque courbe équivariante son quotient muni du diviseur de branchement, on obtient un morphisme

$$\Phi \colon \mathcal{M}_{g,g'}[G] \to \mathcal{M}_{g'}^{[n]}.$$

Notons $\mathfrak{C}$ la courbe universelle au-dessus de $\mathcal{M}_{g'}^{[n]}$ et $\mathfrak{B}$ le diviseur universel. Notons de plus $\mathfrak{f} \colon \mathfrak{C} \setminus |\mathfrak{B}| \to \mathcal{M}_{g'}^{[n]}$. On peut alors, à tout morphisme $S \to \mathcal{M}_{g,g'}[G]$, associer un G-torseur au-dessus de $(\mathfrak{C} \setminus |\mathfrak{B}|) \times_{\mathcal{M}_{g'}} S$ puis un morphisme de $S \to [\mathrm{R}^1 \mathfrak{f}_* G]$, ce dernier espace étant un analogue champêtre des $\mathrm{R}^1 f_* G$. On obtient ainsi un morphisme de champs $\mathcal{M}_{g,g'}[G] \to [\mathrm{R}^1 \mathfrak{f}_* G]$ dont l'image est en fait dans la strate $[\mathrm{R}^1 \mathfrak{f}_* G]_{\mathfrak{g}=g}$.

En utilisant [dJ97], nous montrons qu'il existe une altération $X \to [\mathrm{R}^1 \mathfrak{f}_* G]_{\mathfrak{g}=n}$ et un diagramme commutatif

$$\begin{tikzcd} & X \arrow[dl] \arrow[d] \\ \mathcal{M}_{g,g'}[G] \arrow[r] & {[\mathrm{R}^1 \mathfrak{f}_* G]_{\mathfrak{g}=g}}. \end{tikzcd}$$

Le cas d'un morphisme f comme en début d'introduction s'obtient alors par changement de base à partir de ce cas universel. D'autre part nous montrons que, quitte à remplacer $[\mathrm{R}^1 \mathfrak{f}_* G]$ par une des rigidifications données par le théorème 1.1, le morphisme $\mathcal{M}_{g,g'}[G] \to [\mathrm{R}^1 \mathfrak{f}_* G]_{\mathfrak{g}=g}$ est une immersion fermée.

Nous commençons donc au § 2 par quelques rappels sur les espaces de torseurs, en particulier des dévissages cohomologiques et des applications de la suite exacte de déformation d'Artin-Schreier à Kummer, et obtenons les premiers résultats sur les faisceaux $\mathrm{R}^i f_* G$ qui nous seront utiles par la suite.

Dans § 3 nous introduisons l'analogue champêtre $[\mathrm{R}^i f_* G]$ des faisceaux $\mathrm{R}^i f_* G$ et montrons l'existence d'une rigidification ind-représentable comme énoncée dans le théorème 1.1. Celle-ci permet alors de conclure sur la nullité des $\mathrm{R}^2 f_* G$ dans le cas affine.

L'étude du morphisme Φ construit ci-dessus fait l'objet du § 4 qui introduit proprement les espaces de modules utilisé ci-dessus, la stratification par le genre puis démontre les liens entre les espaces construits.

Finalement, nous utilisons les constructions de ce chapitre dans l'appendice § 5 pour retrouver simplement des résultats connus sur l'espace des modules des courbes équivariantes dans le cas modéré.

Remerciements : L'auteur remercie Laurent Moret-Bailly, Lorenzo Ramero, Michel Raynaud et Matthieu Romagny et pour les conversations qu'il a pu avoir avec chacun d'eux pendant la préparation de cet article.

2 Faisceaux de torseurs

Le but de cette section est de donner quelques résultats sur les torseurs et en particulier de généraliser des résultats de Harbater (cf. [Har80]) et de Katz (cf. [Kat86]). Plus précisément, soit C une courbe lisse sur un corps algébriquement clos k, U un sous-schéma ouvert de C affine et G un groupe abstrait. L'un des buts de chacun de ces articles était de calculer le groupe $\mathrm{H}^1_{\text{ét}}(U, G)$ et de donner ainsi un principe local-global pour les revêtements.

Nous souhaitons ici généraliser ce résultat dans le cas d'une courbe relative $\mathcal{C} \to S$. Pour cela, l'un des instruments essentiels est la suite exacte de déformation d'Artin-Schreier à Kummer dont nous rappelons la théorie ci-après.

Dans toute la suite, lorsque les groupes ne sont pas commutatifs, les suites exactes de cohomologie sont à comprendre au sens non abélien, i.e. suites exactes de faisceaux d'ensembles pointés.

2.1 Rappels et notations

Dans toute la suite de cet article, S sera un schéma, $h\colon X \to S$ un morphisme de schémas et $\mathcal{G}$ un schéma en groupes étale sur X.

Pour $i \leq 2$, on peut alors définir des ensembles pointés $\mathrm{H}^i_{\text{ét}}(\mathcal{C}, \mathcal{G})$, cf. [Gir71]. Nous noterons $\mathrm{R}^i h_* \mathcal{G}$ le faisceau sur le gros site étale $S_{\text{ét}}$ associé au préfaisceau

$$T \mapsto \mathrm{H}^i_{\text{ét}}(X \times_S T, \mathcal{G} \times_S T).$$

Proposition 2.1 *Supposons h propre. Alors $\mathrm{R}^i h_* \mathcal{G}$ est représentable par un espace algébrique pour $i \in \{1, 2\}$.*

Preuve : Pour $i = 1$, le résultat s'obtient de la même manière que dans le cas commutatif en se ramenant à des déformations de torseurs.

Pour $i = 2$, on sait que $\mathrm{H}^2_{\text{ét}}(X \times_S T, \mathcal{G} \times_S T)$ est un espace principal homogène sous $\mathrm{H}^2_{\text{ét}}(X \times_S T, Z(\mathcal{G} \times_S T))$ où $Z(\mathcal{G} \times_S T)$ désigne le centre de $\mathcal{G} \times_S T$ (cf. [Gir71], Théorème IV.3.3.3). Par suite, le faisceau $\mathrm{R}^2 h_* \mathcal{G}$ est un espace principal homogène sous $\mathrm{R}^2 h_* Z(\mathcal{G})$. On se ramène donc au cas abélien, pour lequel le résultat est connu (cf. par exemple [Mil80]). □

Bien évidement, il est possible d'appliquer les opérations classiques de la cohomologie. Nous nous contentons ici de donner les exemples qui nous serons utiles (cf. [Gir71]).

Donnons nous une suite exacte de groupes étales sur S

$$1 \to \mathcal{H} \to \mathcal{G} \to \mathcal{G}/\mathcal{H} \to 1$$

avec $\mathcal{H} \subset Z(\mathcal{G})$. Alors il existe une suite exacte de faisceaux d'ensembles pointés

$$0 \to \mathrm{R}^0 h_* \mathcal{H} \to \mathrm{R}^0 h_* \mathcal{G} \to \mathrm{R}^0 h_* \mathcal{G}/\mathcal{H} \to \mathrm{R}^1 h_* \mathcal{H} \to \mathrm{R}^1 h_* \mathcal{G} \to \mathrm{R}^1 h_* \mathcal{G}/\mathcal{H} \to \mathrm{R}^2 h_* \mathcal{H} \tag{2}$$

Cette suite peut être utilisée pour l'étude des faisceaux de torseurs sous des groupes résolubles afin de se ramener à l'étude des torseurs sous des groupes cycliques.

Le dévissage sous forme de suite exacte comme ci-dessus est très pratique en théorie mais difficile à manipuler en pratique. Dans les faits, il est souvent plus utile d'avoir des caractérisations des extensions galoisiennes d'extensions galoisiennes qui sont elles-mêmes galoisiennes. Ceci est donné par la proposition suivante.

Proposition 2.2 *Soit X un schéma, P et H des groupes finis, Y un P-torseur au-dessus de X et Z un H-torseur au-dessus de Y. Si Z est un schéma connexe alors c'est un $\mathrm{Aut}_X(Z)$-torseur si et seulement si $Z \in \mathrm{H}^1_{ét}(Y, H)^P$.*

De plus, on a une suite exacte $0 \to H \to \mathrm{Aut}_X(Z) \to P \to 0$ et si Z et Z' sont deux H-torseurs au-dessus de Y qui sont isomorphes, alors ils induisent des $\mathrm{Aut}_X(Z)$-torseurs isomorphes au-dessus de X.

En particulier, on a une applications injective

$$\mathrm{H}^1_{ét}(Y, H)^P \to \coprod_{\{0 \to H \to G \to P \to 0\}/isom} \mathrm{H}^1_{ét}(X, G)$$

On prendra garde au fait que $\mathrm{H}^1_{\text{ét}}(Y, H)^P$ n'est pas un groupe en général, même si H est abélien.

Preuve : Pour tout $\sigma \in P$ notons Z_σ le H-torseur au-dessus de Y obtenu par changement de base $\sigma \colon Y \to Y$ à partir de Z.

Supposons tout d'abord que $Z \to X$ est un $\mathrm{Aut}_X(Z)$-torseur. En particulier, on a un morphisme surjectif $\mathrm{Aut}_X(Z) \to P$. N'importe quel relèvement de σ dans $\mathrm{Aut}_X(Z)$ fournit alors un isomorphisme entre Z_σ et Z.

Réciproquement, supposons que $Z \in \mathrm{H}^1_{\text{ét}}(Y, H)^P$. D'après [Méz00], Lemma 2.8. il suffit de prouver que $Z \times_X Z$ est totalement décomposé. Comme $Y \to X$ est un P-torseur, on a un isomorphisme

$$Z \times_X Z \cong \prod_{\sigma \in P} Z_\sigma \times_Y Z.$$

Par suite, il suffit de montrer que $Z_\sigma \times_Y Z$ est un produit de copies de Z. Or par hypothèse, Z et Z_σ sont isomorphes en tant que H-torseurs donc $Z_\sigma \times_Y Z \cong Z \times_Y Z \cong \prod_{\tau \in H} Z$. Ce qui fournit le résultat annoncé.

La dernière partie est claire. □

Donnons nous maintenant un morphisme propre $h \colon \mathcal{C} \to S$ ainsi qu'une immersion ouverte $j \colon \mathcal{U} \to \mathcal{C}$ et notons $f \colon \mathcal{U} \to S$ le morphisme induit. On se fixe également un schéma en groupes étale $\mathcal{G}$ sur $\mathcal{U}$.

On a alors une suite exacte à 5 termes

$$0 \to \mathrm{R}^1 h_*(j_*\mathcal{G}) \to \mathrm{R}^1 f_*\mathcal{G} \to h_*\mathrm{R}^1 j_*\mathcal{G} \to \mathrm{R}^2 h_*(j_*\mathcal{G}) \to \mathrm{R}^2 f_*\mathcal{G} \tag{3}$$

obtenue en faisceautisant l'analogue non abélien de la suite exacte en bas degré obtenue par la suite spectrale de Leray (cf. [Gir71], Chapitre V).

Cette suite permet de décomposer $\mathrm{R}^1 f_*\mathcal{G}$ en un terme local $h_*\mathrm{R}^1 j_*\mathcal{G}$ et en termes globaux, cette suite est l'un des outils fondamentaux utilisés par Harbater (cf. [Har80]) et Katz (cf. [Kat86]) lorsque S est le spectre d'un corps algébriquement clos. La suite exacte ci-dessus doit être vue comme un principe local-global. Elle est toutefois complètement différente de celle de Bertin et Mézard dans [BM00] car elle ne dit rien sur les déformations infinitésimales de courbes.

À partir de maintenant, nous supposerons que h est une courbe propre et lisse et que $\mathcal{U}$ est le complémentaire dans $\mathcal{C}$ d'un diviseur de Cartier relatif.

2.2 La suite exacte d'Artin-Schreier à Kummer et quelques conséquences

Nous allons maintenant rappeler quelques propriétés de la déformation d'Artin-Schreier à Kummer (pour plus de détail, voir [SOS89]) et donnerons quelques conséquences, la plus importante étant la proposition 2.5.

Dans toute la suite, nous fixons un nombre premier p et un anneau de valuation discrète R_0 de caractéristiques $(0, p)$ contenant une racine p-ième de l'unité ζ. Notons $\lambda = \zeta - 1$. Il est alors aisé de voir que $\lambda^{p-1} = up$ avec u inversible dans R_0.

Pour tout R_0-schéma X et tout $\mu \in R_0$ dans l'idéal maximal de R_0, notons $\mathscr{G}_X^{(\mu)} = X \times_{R_0} \operatorname{Spec} R_0 \left[x, \frac{1}{\mu x+1}\right]$. On peut munir $\mathscr{G}_X^{(\mu)}$ d'une structure de schéma en groupes en utilisant la loi $a * b = \mu ab + a + b$. Sa partie en caractéristique 0 est alors isomorphe à $\mathbb{G}_m$ et celle en caractéristique p à $\mathbb{G}_a$.

Notons i_μ l'immersion $X \times_{R_0} \operatorname{Spec} R_0/(\mu) \to X$. On a une suite exacte pour la topologie *fppf*

$$0 \to \mathscr{G}_X^{(\mu)} \to \mathbb{G}_m \to i_{\mu *}\mathbb{G}_m \to 0 \tag{4}$$

On définit alors un morphisme de groupes $\psi : \mathscr{G}_X^{(\lambda)} \to \mathscr{G}_X^{(\lambda^p)}$ par $x \mapsto \frac{(\lambda x+1)^p - 1}{\lambda^p}$ qui est bien défini car $\lambda^{p-1} = up$. On voit alors que ψ est fidèlement plat et que son noyau est (non canoniquement) isomorphe à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. On a ainsi une suite exacte sur le gros site étale

$$0 \to \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to \mathscr{G}_X^{(\lambda)} \to \mathscr{G}_X^{(\lambda^p)} \to 0 \tag{5}$$

dont la fibre spéciale s'identifie à la suite exacte d'Artin-Schreier et la fibre générique à la suite exacte de Kummer.

Appliquons cette théorie dans notre cas. Pour cela, considérons un R_0-schéma S, une courbe propre et lisse $h\colon \mathcal{C} \to S$ et un ouvert $\mathcal{U} \subset S$ qui est le complémentaire d'un diviseur de Cartier relatif. Notons $j\colon \mathcal{U} \to \mathcal{C}$ l'inclusion et $i_\mu\colon \mathcal{U} \times_{R_0} \operatorname{Spec} \mathrm{R}_0/(\mu) \to \mathcal{U}$. Regardons tout d'abord la cohomologie de $\mathbb{G}_m$:

Lemme 2.3 *On a* $\mathrm{R}^1 j_* \mathbb{G}_m = \mathrm{R}^1 j_* i_{\mu *} \mathbb{G}_m = 0 = (\mathrm{R}^2 j_* \mathbb{G}_m)_{tors} = (\mathrm{R}^2 j_* i_{\mu *} \mathbb{G}_m)_{tors}$.

Preuve : La condition sur les termes de degré 1 est en fait un résultat de trivialité de faisceaux inversibles. Pour la montrer on peut supposer que S est local. Comme le résultat est local sur $\mathcal{C}$, on peut remplacer ce dernier par un schéma local affine. Il s'agit alors de montrer que tout faisceau inversible de $\mathrm{H}^1_{\text{ét}}(\mathcal{U}, \mathbb{G}_m)$ est trivial, c'est-à-dire que le torseur correspondant possède une section.

Notons k le corps résiduel du point fermé de S. Comme $\mathcal{C}_s$ est régulier, tout faisceau inversible de $\mathcal{U}_s$ peut se prolonger en faisceau inversible sur $\mathcal{C}_s$. Or ces derniers sont triviaux car $\mathcal{C}_s$ est local. Il est alors aisé de passer au cas où S est local en relevant une base.

Regardons maintenant les termes de degré 2. D'après [Mil80], Theorem III.3.9, on peut remplacer S par le spectre d'un anneau local complet A à corps résiduel algébriquement clos d'idéal maximal $\mathfrak{m}$, $\mathcal{C}$ par $\operatorname{Spec} A[[x]]$ et $\mathcal{U}$ par $\operatorname{Spec} A[[x]][\frac{1}{f}]$ où f est une fonction régulière modulo $\mathfrak{m}$.

Si A est un corps, alors la nullité provient de l'étude du groupe de Brauer des corps locaux (cf. [Ser62]). Si A est artinien, la nullité de $\mathrm{H}^2_{ét}(\operatorname{Spec} A[[x]][\frac{1}{f}], \mathbb{G}_m)$ se démontre *via* la théorie des déformations en utilisant le fait que $\operatorname{Spec} A[[x]][\frac{1}{f}]$ est affine, ce qui implique que $\mathrm{H}^2_{ét}(\operatorname{Spec} A[[x]][\frac{1}{f}], \mathbb{G}_a) = 0$.

Dans le cas général (complet), on a un morphisme canonique

$$\mathrm{H}^2_{et}(\operatorname{Spec} A[[x]][\frac{1}{f}], \mathbb{G}_m) \to \varprojlim_n \mathrm{H}^2_{et}(\operatorname{Spec}(A/\mathfrak{m}^n)[[x]][\frac{1}{f}], \mathbb{G}_m)$$

dont il semble difficile de montrer l'injectivité. Toutefois, d'après [Gab81], le morphisme induit sur les parties de torsions s'identifie à

$$\operatorname{Br}(\operatorname{Spec} A[[x]][\frac{1}{f}]) \to \varprojlim_n \operatorname{Br}(\operatorname{Spec}(A/\mathfrak{m}^n)[[x]][\frac{1}{f}]).$$

La démonstration de l'injectivité est alors semblable à [Gro68], Lemme 3.3 en utilisant la trivialité de $\mathrm{H}^1_{et}(\operatorname{Spec} A[[x]][\frac{1}{f}], \mathbb{G}_m)$ démontrée ci-dessus. □

En appliquant j_* à la suite exacte (4), on trouve le corollaire suivant.

Corollaire 2.4 *Avec les notations ci-dessus, on a*

$$\mathrm{R}^1 j_* \mathscr{G}^{(\mu)}_{\mathcal{U}} = (\mathrm{R}^2 j_* \mathscr{G}^{(\mu)}_{\mathcal{U}})_{tors} = 0.$$

Preuve : Cela provient de la suite exacte (4) et de la surjectivité du morphisme $j_* \mathbb{G}_m \to j_* i_{\mu *} \mathbb{G}_m$. □

Nous pouvons maintenant passer à la cohomologie de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Proposition 2.5 *On a deux suites exactes pour la topologie étale*

$$0 \to h_* \left((j_* \mathscr{G}^{(\lambda)}_U)/\mathscr{G}^{(\lambda)}_{\mathcal{C}} \right) \to h_* \left((j_* \mathscr{G}^{(\lambda^p)}_{\mathcal{U}})/\mathscr{G}^{(\lambda^p)}_{\mathcal{C}} \right) \to h_* \mathrm{R}^1 j_* \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to 0. \quad (6)$$

$$h_* \mathrm{R}^1 j_* \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to \mathrm{R}^2 h_* \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to \mathrm{R}^2 f_* \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to 0 \quad (7)$$

Preuve : En prenant la suite exacte longue de cohomologie associée à la suite (5) par application du foncteur j_* on obtient une suite exacte

$$0 \to \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to j_*\mathscr{G}_{\mathcal{U}}^{(\lambda)} \to j_*\mathscr{G}_{\mathcal{U}}^{(\lambda^p)} \to \mathrm{R}^1 j_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to \mathrm{R}^1 j_*\mathscr{G}_{\mathcal{U}}^{(\lambda)}$$

dont le dernier terme est nul d'après le corollaire précédent.

En particulier, on a un diagramme commutatif à lignes exactes

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \arrow[r] \arrow[d] & \mathscr{G}_{\mathcal{C}}^{\lambda} \arrow[r] \arrow[d] & \mathscr{G}_{\mathcal{C}}^{(\lambda^p)} \arrow[r] \arrow[d] & 0 & \\
0 \arrow[r] & \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \arrow[r] & j_*\mathscr{G}_{\mathcal{U}}^{\lambda} \arrow[r] & j_*\mathscr{G}_{\mathcal{U}}^{(\lambda^p)} \arrow[r] & \mathrm{R}^1 j_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \arrow[r] & 0.
\end{tikzcd}$$

Le lemme du serpent fournit alors la suite exacte

$$0 \to (j_*\mathscr{G}_{\mathcal{U}}^{(\lambda)})/\mathscr{G}_{\mathcal{C}}^{(\lambda)} \to (j_*\mathscr{G}_{\mathcal{U}}^{(\lambda^p)})/\mathscr{G}_{\mathcal{C}}^{(\lambda^p)} \to \mathrm{R}^1 j_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to 0. \tag{8}$$

Les faisceaux présents dans cette suite étant à support fini sur S (le support est dans $\mathcal{C} \setminus \mathcal{U}$ qui est le support d'un diviseur de Cartier relatif), on obtient la suite exacte (6) en appliquant le foncteur h_* qui est exact sur ces faisceaux.

La suite exacte (7) provient de la suite spectrale de Leray

$$\mathrm{R}^\ell h_* \mathrm{R}^m j_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \Rightarrow \mathrm{R}^{\ell+m} f_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$$

et d'un argument de dégénérescence *via* le lemme suivant.

Lemme 2.6 *On a*

$$\mathrm{R}^3 h_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathrm{R}^2 h_* \mathrm{R}^1 j_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathrm{R}^1 h_* \mathrm{R}^1 j_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathrm{R}^2 j_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = 0.$$

Preuve : On a $\mathrm{R}^3 h_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = 0$ pour des raisons de dimension cohomologique (cf. [Mil80], Corollary VI.2.5).

D'après la suite exacte (8), on voit que $\mathrm{R}^1 j_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est à support de dimension relative nulle sur S (car dans $\mathcal{C} \setminus \mathcal{U}$), donc $\mathrm{R}^\ell h_* \mathrm{R}^1 j_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = 0$ pour tout $\ell > 0$.

La suite exacte longue associée à la suit exacte (5) nous donne

$$\mathrm{R}^1 j_*\mathscr{G}_{\mathcal{U}}^{(\lambda^p)} \to \mathrm{R}^2 j_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to \mathrm{R}^2 j_*\mathscr{G}_{\mathcal{U}}^{(\lambda)}.$$

Mais comme $\mathrm{R}^2 j_*(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})_{\mathcal{U}}$ est de torsion, on a en fait une suite exacte

$$\mathrm{R}^1 j_*\mathscr{G}_{\mathcal{U}}^{(\lambda^p)} \to \mathrm{R}^2 j_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to (\mathrm{R}^2 j_*\mathscr{G}_{\mathcal{U}}^{(\lambda)})_{tors}.$$

Or on a vu que $\mathrm{R}^1 j_*\mathscr{G}_{\mathcal{U}}^{(\lambda^p)} = 0$ et $(\mathrm{R}^2 j_*\mathscr{G}_{\mathcal{U}}^{(\lambda)})_{tors} = 0$. $\square$

3 Représentabilité et description

Notre but est ici de généraliser aux champs algébriques les constructions faites dans 2.1 puis de montrer l'existence d'une rigidification comme dans le théorème 1.1. Cette rigidification permettra alors de conclure sur la nullité de $\mathrm{R}^2 f_* \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Fixons un champ algébrique $\mathcal{S}$ et un champ algébrique en groupes représentable et étale $\mathcal{G} \to \mathcal{S}$.

Définition 3.1 Soit $f\colon \mathcal{X} \to \mathcal{S}$ un morphisme représentable de champs algébriques. Notons $[\mathrm{R}^1 f_* \mathcal{G}]$ le groupoïde sur $\mathcal{S}$ dont les fibres au-dessus d'un schéma T sont les catégories dont

- les objets sont les couples $(\alpha,\ \xi)$ avec $\alpha\colon T \to \mathcal{S}$ et $\xi \in \mathrm{H}^0(T, \mathrm{R}^1 f_{T*} \mathcal{G}_T)$ où f_T et $\mathcal{G}_T$ sont obtenus de f et $\mathcal{G}$ par changement de base ;
- les morphismes sont les automorphismes de α qui laissent fixe ξ.

Lorsque $\mathcal{S}$ est un espace algébrique, on retrouve le faisceau $\mathrm{R}^1 f_* \mathcal{G}$ comme défini précédemment.

Le groupoïde $[\mathrm{R}^1 f_* \mathcal{G}]$ doit être vu comme un espace de module grossier "partiel" associé à $f_*[\mathcal{U}/\mathcal{G}]$ qui vit au-dessus de $\mathcal{S}$. En particulier, on a un morphisme de $\mathcal{S}$-groupoïde

$$f_*[\mathcal{U}/\mathcal{G}] \to [\mathrm{R}^1 f_* \mathcal{G}].$$

Le groupoïde $[\mathrm{R}^1 f_* \mathcal{G}]$ est en fait un champ (ceci provient du fait qu'on considère le faisceau $\mathrm{R}^1 f_* \mathcal{G}$). Par contre, même sous des hypothèses très restrictives, il n'est pas algébrique. Le problème fondamental est que le faisceau des automorphismes d'un objet n'est pas représentable en général.

Comme $[\mathrm{R}^1 f_* \mathcal{G}]$ n'est pas représentable en général, on ne peut pas parler de séparation. Par contre, on peut vérifier le critère valuatif de séparation.

Proposition 3.2 *Le morphisme* $[\mathrm{R}^1 f_* \mathcal{G}] \to \mathcal{S}$ *vérifie le critère valuatif de séparation.*

Preuve : Donnons nous un anneau de valuation R de corps de fractions K et un morphisme $\phi\colon \operatorname{Spec} K \to [\mathrm{R}^1 f_* \mathcal{G}]$. Quitte à faire un changement de base étale, on peut supposer que ϕ représente un $\mathcal{G}$-torseur $V \to \mathcal{U} \times_{\mathcal{S}} \operatorname{Spec} K$. Par suite, si V peut s'étendre en un torseur $\mathcal{V}$ au-dessus de $\mathcal{U} \times_{\mathcal{S}} \operatorname{Spec} R$, cela ne peut être que de manière unique car $\mathcal{V}$ est alors le normalisé de $\mathcal{U} \times_{\mathcal{S}} \operatorname{Spec} R$ dans l'anneau total des fractions de V. □

La suite exacte (3) suggère d'introduire un analogue local de l'espace $[\mathrm{R}^1 f_* \mathcal{G}]$:

Définition 3.3 Soient $\mathcal{S}$ un champ algébrique, $h\colon \mathcal{C} \to \mathcal{S}$ une courbe propre et lisse et $j\colon \mathcal{U} \to \mathcal{C}$ le complémentaire d'un diviseur de Cartier relatif $\mathcal{B}$.

On définit alors $[h_* \mathrm{R}^1 j_* \mathcal{G}]$ comme étant le groupoïde dont les objets au-dessus d'un schéma $\mathcal{S}$-schéma T sont les éléments de $(\mathrm{R}^1 j_{T*} \mathcal{G})(\mathcal{U} \times_{\mathcal{S}} T)$ et les morphismes entre deux tels objets ξ et ξ' sont les morphismes de $T \to \mathcal{S}$ qui envoient ξ sur ξ'.

Par localisation, on obtient un morphisme naturel

$$[\mathrm{R}^1 f_* \mathcal{G}] \to [h_* \mathrm{R}^1 j_* \mathcal{G}]$$

et la suite exacte (3) permet d'en préciser l'image et les fibres. Ce principe local-global permet en particulier de montrer la proposition suivante dans laquelle on suppose $\mathcal{G} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Proposition 3.4 *Soient $\mathcal{S}$ un champ algébrique, $h\colon \mathcal{C} \to \mathcal{S}$ une courbe propre et lisse et $j\colon \mathcal{U} \to \mathcal{C}$ le complémentaire d'un diviseur de Cartier relatif $\mathcal{B}$. Si l'entier p est premier à toutes les caractéristiques résiduelles de $\mathcal{S}$ alors $[\mathrm{R}^1 f_* \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$ est représentable.*

Si le champ $\mathcal{S}$ est le spectre d'un corps algébriquement clos de caractéristique p, alors les points géométriques de $[\mathrm{R}^1 f_* \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$ sont les points d'une limite inductive de schémas : l'espace des modules formels de Harbater.

Preuve : On se ramène aisément au cas où $\mathcal{S}$ est un espace algébrique. Comme h est propre, les faisceaux $\mathrm{R}^i h_* \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ sont représentables. Utilisant la suite (3) on se ramène à montrer que $[h_* \mathrm{R}^1 j_* \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$ est représentable.

Par suite la première partie est classique (voir la section 5), la deuxième est démontrée par Harbater dans [Har80]. □

En particulier, même si $\mathcal{S}$ est un champ algébrique quelconque, on peut parler de l'ensemble des points géométriques à valeur dans $[\mathrm{R}^1 f_* \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$: il suffit de considérer les fibres géométriques de $[\mathrm{R}^1 f_* \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}] \to \mathcal{S}$ et l'ensemble de leurs points géométriques, ce qui a un sens d'après la proposition ci-dessus.

Le problème fondamental pour la représentabilité de $[\mathrm{R}^1 f_* \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$ est que les déformations d'un torseur au-dessus d'un schéma affine sont toutes isomorphes. Si $[\mathrm{R}^1 f_* \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$ était représentable, il serait étale sur $\mathcal{S}$, or on voit aisément avec l'espace de modules formels d'Harbater que ce n'est pas le cas (cf. [Har80]).

3.1 Rigidification des $[\mathrm{R}^i f_* \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$

Nous allons maintenant introduire un espace proche de ce que devrait être l'espace des déformations de $[h_* \mathrm{R}^1 j_* \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$ si ce dernier était représentable. Pour cela, l'outil fondamental est la suite exacte (6).

Dans toute la suite on se fixe un premier p ainsi qu'une racine primitive p-ième ζ de l'unité dans $\bar{\mathbb{Q}}$. On notera de plus $\lambda = \zeta - 1$ (cf. 2.2).

Définition 3.5 Soient $\mathcal{S}$ un $\mathbb{Z}[\zeta]$-champ algébrique, $\mu \in \mathbb{Z}[\zeta]$, $h\colon \mathcal{C} \to \mathcal{S}$ une courbe propre et lisse et $j\colon \mathcal{U} \to \mathcal{C}$ le complémentaire d'un diviseur de Cartier relatif. Nous noterons $\mathscr{T}_\mu(f)_{loc}$ le $\mathcal{S}$-groupoïde dont les objets au-dessus d'un morphisme $\alpha\colon T \to \mathcal{S}$ sont les éléments de $h_* \left((j_* \mathcal{G}_{\mathcal{U}}^{(\mu)}) / \mathcal{G}_{\mathcal{C}}^{(\mu)} \right)(T)$ et les morphismes entre deux objets ξ et ξ' sont les isomorphismes de α qui envoient ξ sur ξ'.

En particulier, on a un morphisme $\phi\colon \mathscr{T}_\lambda(f)_{loc} \to \mathscr{T}_{\lambda^p}(f)_{loc}$ (cf. 2.2).

On voit aisément que $\mathscr{T}_\mu(f)_{loc}$ est un champ. D'autre part, il existe un morphisme canonique

$$\mathscr{T}_{\lambda^p}(f)_{loc} \to [h_*\mathrm{R}^1 j_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$$

qui est un épimorphisme pour la topologie étale d'après la suite exacte (6).

Contrairement aux espaces précédemment introduit, $\mathscr{T}_\mu(f)_{loc}$ est presque représentable. On effet, on a la proposition suivante.

Proposition 3.6 *Le groupoïde $\mathscr{T}_\mu(f)_{loc}$ est une limite inductive de champs algébriques de type finis et lisses sur $\mathcal{S}$.*

Preuve : Quitte à faire un changement de base lisse, on peut supposer que $\mathcal{S}$ est en fait un schéma. Notons $\mathcal{B}$ un diviseur de Cartier relatif tel que $\mathcal{U} = \mathcal{C} \setminus |\mathcal{B}|$. Alors on voit qu'ensemblistement (les structures de groupes n'étant pas les mêmes) on a

$$h_*\left((j_*\mathcal{G}_{\mathcal{U}}^{(\lambda^p)})/\mathcal{G}_{\mathcal{C}}^{(\lambda^p)}\right) = \varinjlim_n h_*\left({}_{\mathcal{C}}(n\mathcal{B})/_{\mathcal{C}}\right)$$

et ce dernier est représentable car $\mathcal{B}$ est fini et plat sur $\mathcal{S}$.

Finalement la lissité provient de la platitude de ${}_{\mathcal{C}}(n\mathcal{B})/_{\mathcal{C}}$ et du fait que le faisceau de ses sections est représentable par $\mathrm{Spec}\left(\mathrm{Sym} h_*\left({}_{\mathcal{C}}(n\mathcal{B})/_{\mathcal{C}}\right)^\vee\right)$. $\square$

On peut donc voir $\mathscr{T}_{\lambda^p}(f)_{loc}$ comme une rigidification de $[h_*\mathrm{R}^1 j_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$. Nous allons maintenant introduire une rigidification de $[\mathrm{R}^1 f_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$ en utilisant $\mathscr{T}_{\lambda^p}(f)_{loc}$ et la suite exacte (3).

Définition 3.7 Soient $\mathcal{S}$ un $\mathbb{Z}[\zeta]$-champ algébrique, $h\colon \mathcal{C} \to \mathcal{S}$ une courbe propre et lisse et $j\colon \mathcal{U} \to \mathcal{C}$ le complémentaire d'un diviseur de Cartier relatif. On note

$$\mathscr{T}_{\lambda^p}(f) = [\mathrm{R}^1 f_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}] \times_{[h_*\mathrm{R}^1 j_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]} \mathscr{T}_{\lambda^p}(f)_{loc}.$$

Si $\mathcal{S}$ est un espace algébrique, on a une suite exacte

$$0 \to \mathrm{R}^1 h_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to \mathscr{T}_{\lambda^p}(f) \to \mathscr{T}_{\lambda^p}(f)_{loc} \to \mathrm{R}^2 h_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}.$$

D'autre part, comme h est propre, $\mathrm{R}^i h_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est représentable pour tout $i \geq 0$. La proposition précédente montre alors que $\mathscr{T}_{\lambda^p}(f)$ est un champ et est limite inductive de champs algébriques.

Proposition 3.8 *Le morphisme canonique $\mathscr{T}_{\lambda^p}(f) \to [\mathrm{R}^1 f_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$ est un épimorphisme pour la topologie étale et son noyau est $\mathscr{T}_\lambda(f)_{loc}$.*

Preuve : Par descente, on se ramène au cas où $\mathcal{S}$ est un espace algébrique. Les champs considérés sont alors des faisceaux. Le résultat découle du diagramme commutatif à lignes exactes

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & \mathrm{R}^1 h_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \arrow[r] \arrow[d, equal] & \mathscr{T}_{\lambda^p}(f) \arrow[r] \arrow[d] & \mathscr{T}_{\lambda^p}(f)_{loc} \arrow[r] \arrow[d] & \mathrm{R}^2 h_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \arrow[d, equal] \\
0 \arrow[r] & \mathrm{R}^1 h_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \arrow[r] & \mathrm{R}^1 f_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \arrow[r] & h_*\mathrm{R}^1 j_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \arrow[r] & \mathrm{R}^2 h_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}
\end{tikzcd}$$

et du fait que le morphisme $\mathscr{T}_{\lambda^p}(f)_{loc} \to h_*\mathrm{R}^1 j_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un épimorphisme pour la topologie étale (voir la suite exacte (6)). $\square$

Remarque 3.9 Dire que le morphisme $\mathscr{T}_{\lambda^p}(f) \to [\mathrm{R}^1 f_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$ est un épimorphisme revient à dire que si on se donne un $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$-torseur on peut l'écrire localement sous la forme $\frac{(\lambda u+1)^p-1}{\lambda^p} = t$.

D'autre part, deux morphismes $T \to \mathscr{T}_p(f)$ sont égaux si et seulement s'ils correspondent localement à des torseurs $\frac{(\lambda u+1)^p-1}{\lambda^p} = t_1$ et $\frac{(\lambda u+1)^p-1}{\lambda^p} = t_2$ avec $t_1 - t_2$ n'ayant pas de pôles (i.e. on ne prend pas de quotients supplémentaires).

Nous pouvons maintenant donner une première application de ces résultats.

Théorème 3.10 *Supposons que f est affine et que $\mathcal{S}$ est un schéma. Alors* $\mathrm{R}^2 f_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = 0$.

Preuve : D'après la suite exacte (7), il suffit de montrer que le morphisme $f_*\mathrm{R}^1 j_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to \mathrm{R}^2 h_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un épimorphisme.

On a un diagramme commutatif dont la première ligne est exacte

$$\begin{tikzcd}
f_*\mathrm{R}^1 j_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \arrow[r] & \mathrm{R}^2 h_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \arrow[r] & \mathrm{R}^2 f_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \\
\mathscr{T}_{\lambda^p}(f)_{loc} \arrow[u] \arrow[ur] & &
\end{tikzcd}$$

D'autre part, le morphisme $f_*\mathrm{R}^1 j_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to \mathrm{R}^2 h_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est surjectif au niveau des points géométriques car $\mathrm{R}^2 f_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = 0$ en chaque point (car f est affine). Par suite, il en est de même du morphisme $\mathscr{T}_{\lambda^p}(f)_{loc} \to \mathrm{R}^2 h_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Comme $\mathscr{T}_{\lambda^p}(f)_{loc}$ est ind-représentable par des schémas lisses (cf. proposition 3.6) et que $\mathrm{R}^2 h_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est constructible, on trouve que $\mathscr{T}_{\lambda^p}(f)_{loc} \to \mathrm{R}^2 h_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un épimorphisme de faisceaux étales. $\square$

Corollaire 3.11 *Supposons que f est affine et que $\mathcal{S}$ est un schéma. Alors pour tout groupe G on a* $\mathrm{R}^2 f_* G = 0$.

Preuve : D'après [Gir71], Théorème IV.3.3.3, il suffit de montrer que $\mathrm{R}^2 f_* Z(G) = 0$. On peut donc supposer que G est abélien. Le résultat découle alors aisément du cas $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ en utilisant la suite (2). $\square$

Corollaire 3.12 *Soit G un groupe et $H \subset Z(G)$ un sous-groupe. Alors on a des suites exactes*

$$0 \to h_*\mathrm{R}^1 j_* H \to h_*\mathrm{R}^1 j_* G \to h_*\mathrm{R}^1 j_* G/H \to 0$$

$$0 \to \mathrm{R}^1 f_* H \to \mathrm{R}^1 f_* G \to \mathrm{R}^1 f_* G/H \to 0$$

Preuve : Cela découle de la suite exacte longue de cohomologie associée à la suite exacte

$$0 \to H \to G \to G/H \to 0$$

et du lemme 2.6 qui assure que $\mathrm{R}^2 j_* G/H = 0$. $\square$

Corollaire 3.13 *Soit G un groupe résoluble. Alors il existe une suite exacte (pour la topologie étale) de champs en ensembles pointés*

$$0 \to \mathscr{T}'_G(f) \to \mathscr{T}_G(f) \to [R^1 f_* G] \to 0$$

où $\mathscr{T}_G(f)$ et $\mathscr{T}'_G(f)$ sont des limites inductives de champs algébriques de types finis lisses sur $\mathcal{S}$.

Preuve : Provient du cas $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et du corollaire ci-dessus par une récurrence immédiate. □

3.2 Un ersatz de produit

Nous aurons besoin dans le chapitre suivant de considérer des produits de la forme

$$\mathscr{T}_G(f) \times_{[\mathrm{R}^1 f_* G]} T$$

pour un morphisme $T \to [\mathrm{R}^1 f_* G]$ donné. Le problème est que de tels produits ne sont pas représentables en général. Nous allons donc introduire maintenant une alternative utilisant les propriétés du morphisme $\mathscr{T}_G(f) \to [\mathrm{R}^1 f_* G]$ démontrée dans le corollaire 3.13.

Fixons un champ algébrique T, un morphisme de champs $T \to [\mathrm{R}^1 f_* G]$ et supposons qu'il existe un relèvement $\phi\colon T \to \mathscr{T}_G(f)$. On définit alors le champ algébrique $\mathscr{T}_G(f) \tilde{\times}_{[\mathrm{R}^1 f_* G]} T$ comme étant l'image schématique du morphisme

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{T}'_G(f) \times T & \to & \mathscr{T}_G(f) \times T \\ (a, b) & \mapsto & (a + \phi(b), b). \end{array}$$

On voit que $\mathscr{T}_G(f) \tilde{\times}_{[\mathrm{R}^1 f_* G]} T$ ainsi que l'inclusion $\mathscr{T}_G(f) \tilde{\times}_{[\mathrm{R}^1 f_* G]} T \to \mathscr{T}_G(f) \times T$ sont indépendants du relèvement ϕ car deux relèvements diffèrent d'un élément de $\mathscr{T}'_G(f)$. Cette construction est donc canonique. D'autre part, elle commute aux changements de bases plats mais pas aux changements de bases quelconques *a priori* (car c'est le cas de l'image schématique).

On peut alors construire un champ algébrique $\mathscr{T}_G(f) \tilde{\times}_{[\mathrm{R}^1 G]} T$ dans le cas général par recollement car tout morphisme $T \to [\mathrm{R}^1 f_* G]$ peut être relevé localement pour la topologie étale. On obtient de plus une immersion fermée $\mathscr{T}_G(f) \tilde{\times}_{[\mathrm{R}^1 f_* G]} T \to \mathscr{T}_G(f) \times T$.

Remarquons que si $[\mathrm{R}^1 f_* G]$ est représentable, alors il est séparé d'après la proposition 3.2 et donc le morphisme $\mathscr{T}_G(f) \times_{[\mathrm{R}^1 f_* G]} T \to \mathscr{T}_G(f) \times T$ est une immersion fermée. On a donc une immersion fermée $\mathscr{T}_G(f) \tilde{\times}_{[\mathrm{R}^1 f_* G]} T \to \mathscr{T}_G(f) \times_{[\mathrm{R}^1 f_* G]} T$ qui est une bijection. Seule la structure de sous-schéma fermé de $\mathscr{T}_G(f) \times T$ est éventuellement différente.

On a finalement la propriété suivante qui est une conséquence directe du fait que $\mathscr{T}_G(f) \to [\mathrm{R}^1 f_* G]$ est un épimorphisme pour la topologie étale.

Proposition 3.14 *Le morphisme canonique $\mathscr{T}_G(f) \tilde{\times}_{[\mathrm{R}^1 f_* G]} T \to T$ est un épimorphisme pour la topologie étale.*

4 Extensions de torseurs et courbes équivaraintes

Le but de ce chapitre est de comparer les espaces de torseurs introduit précédemment à des espaces de modules de courbes équivariantes.

Dans un premier temps, nous donnons quelques résultats préliminaires, en particulier une propriété d'extensions de morphismes de torseurs en morphismes entre courbes lisses. Nous passons ensuite à quelques propriétés du genre des courbe affines, ce qui nous permet de définir une stratification des espaces $[\mathrm{R}^1 f_* G]$. nous comparons ensuite les strates obtenues à des espaces de modules de courbes.

4.1 Préliminaires

Nous rassemblons ici quelques résultats techniques qui jouerons des rôles fondamentaux dans la suite.

Théorème 4.1 *Soient Y un schéma localement noethérien et $f\colon X \to Y$ un morphisme localement de type fini. Alors f est une immersion fermée si et seulement si les conditions suivantes sont vérifiées*

i) pour tout corps algébriquement clos k, l'application induite $X(\mathrm{Spec}\, k) \to Y(\mathrm{Spec}\, k)$ est injective ;

ii) le morphisme f vérifie le critère valuatif de propreté ;

iii) pour tout corps algébriquement clos k, l'application induite $X(\mathrm{Spec}\, k[\epsilon]/(\epsilon^2)) \to Y(\mathrm{Spec}\, k[\epsilon]/(\epsilon^2))$ est injective

Preuve : Le sens direct est évident. Réciproquement, d'après la propriété *ii*), le morphisme f est propre. La propriété *i*) impose alors que f induit une bijection entre X et un sous-schéma fermé de Y. Par suite, la proposition *iii*) montre que f est une immersion fermée. □

Nous souhaitons regarder les courbes affines sur des bases relativement quelconques qui possèdent des compactifications lisses. L'outil principal pour cela est le théorème d'altérations de de Jong.

Théorème 4.2 *Soit S un schéma, $\mathcal{V} \to S$ une courbe lisse non nécessairement propre. Supposons que*

i) les fibres géométriques de $\mathcal{V} \to S$ sont connexes ;

ii) il existe un entier g tel que pour tout point géométrique $\bar{s} \to S$, l'unique complétion lisse de $\mathcal{V}_{\bar{s}}$ est de genre g.

Alors il existe une altération $S' \to S$ et une courbe propre et lisse $\mathcal{D} \to S'$ contenant $\mathcal{V} \times_S S'$.

Preuve : C'est un corollaire de [dJ97] qui permet de trouver une altération et une compactification semi-stable. Les hypothèses faites permettent alors de voir que la compactification semi-stable est en fait lisse. □

Dans le cas général, la compactification n'a aucune raison d'être unique : si c'est le cas pour un corps, ce n'est déjà plus vrai pour des anneaux artiniens.

Toutefois, si S' est normal, il est alors aisé de montrer que $\mathcal{D}$ est unique à unique isomorphisme près. Le cas réduit semble plus difficile, le problème principal venant du fait que pour une courbe propre et lisse $\mathcal{D} \to S$, le schéma des automorphismes $\mathrm{Aut}_S(\mathcal{D})$ est parfois ramifié sur S. Par contre, ce ne sera plus le cas si $\mathcal{D} \to S$ est de genre ≥ 2 (cf. [DM69]).

Il est possible de prouver l'unicité lorsqu'un morphisme fini vers une courbe lisse est fixé. C'est l'objet du corollaire 4.4. Avant cela, nous avons besoin d'un lemme précisant la géométrie du schéma des automorphismes.

Lemme 4.3 *Soit S un schéma, $\mathcal{C} \to S$ une courbe propre et lisse et pour $i \in \{1, 2\}$, $\pi_i \colon \mathcal{D}_i \to \mathcal{C}$ des S-morphismes entre courbes lisses, séparables dans chaque fibre au-dessus de S. Alors le schéma des isomorphismes* $\mathrm{Isom}_{\mathcal{C}}(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2) \subset \mathrm{Isom}_S(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2)$ *classifiant les S-isomorphismes $\mathcal{D}_1 \to \mathcal{D}_2$ commutants avec π_1 et π_2, est fini et non ramifié sur S.*

Preuve : Tout d'abord, on voit que $\mathrm{Isom}_{\mathcal{C}}(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2) \subset \mathrm{Isom}_S(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2)$ est représentable sur S car les courbes sont propres sur S. Montrons qu'il est quasi-fini sur S. Pour cela, on peut supposer que S est le spectre d'un corps. Les corps de fractions de $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont finis sur le corps de fractions de $\mathcal{C}$, il n'existe donc qu'un nombre fini d'isomorphismes.

Par suite, il suffit de montrer qu'il est propre et non ramifié.

Pour ce qui est de la propreté, il suffit de vérifier le critère valuatif car on sait déjà qu'il est de présentation finie sur S. On est donc ramené au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation. Par suite, si on a un isomorphisme à la fibre générique, on peut l'étendre car $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont les normalisations de $\mathcal{C}$ dans leur corps de fractions.

Passons maintenant à la non ramification. Pour cela, on peut supposer que S est le spectre d'un anneau artinien A de corps résiduel algébriquement clos, que $\mathcal{D}_1 = \mathcal{D}_2$ et qu'on a $\phi \in \mathrm{Isom}_{\mathcal{C}}(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_1)$ qui est l'identité modulo un élément $\epsilon \in A$ annulé par l'idéal maximal de A.

Notons D_1 la fibre spéciale de $\mathcal{D}_1$. Utilisant la théorie des déformations des courbes, on voit que ϕ définit un élément de $\chi \in \mathrm{H}^0(D_1, \Omega^{\vee}_{D_1})$. Soit $\mathfrak{p} \in D_1$ un point en lequel le morphisme π_1 est étale. Comme ϕ est un $\mathcal{C}$-morphisme, on trouve que χ possède un zéro en $\mathfrak{p}$. Le morphisme π étant génériquement étale, le champ de vecteur χ s'annule sur un ensemble dense. Il s'ensuit que $\chi = 0$ et donc $\phi = Id$. $\square$

Corollaire 4.4 *Soit S un schéma noethérien* réduit, *$\mathcal{C} \to S$, $\mathcal{D}_1 \to S$ et $\mathcal{D}_2 \to S$ trois courbes propres et lisses, $\pi_1 \colon \mathcal{D}_1 \to \mathcal{C}$ et $\pi_2 \colon \mathcal{D}_2 \to \mathcal{C}$ deux revêtements finis tels que leur lieu de branchement soit contenu dans le support d'un diviseur de Cartier relatif $B \subset \mathcal{C}$. En particulier, on suppose que π_1 et π_2 sont génériquement séparables dans chaque fibre au-dessus de S. Notons $\mathcal{V}_i := \pi_i^{-1}(\mathcal{C} \setminus B)$ et donnons nous un $\mathcal{C}$-isomorphisme $\phi \colon \mathcal{V}_1 \to \mathcal{V}_2$ au-dessus de $\mathcal{C} \setminus B$. Alors ϕ s'étend en un* unique *$\mathcal{C}$-isomorphisme $\mathcal{D}_1 \to \mathcal{D}_2$.*

Preuve : Il s'agit de construire une section $S \to \mathrm{Isom}_{\mathcal{C}}(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2)$ induisant ϕ.

Supposons dans un premier temps que S est le spectre d'un corps ou bien le spectre d'un anneau de valuation, ou plus généralement si S est normal. Alors le

résultat est trivialement vrai car ϕ induit un isomorphisme sur les normalisations de $\mathcal{C}$ dans les corps de fractions de $\mathcal{V}_1$ et de $\mathcal{V}_2$, comme celles-ci sont $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$, on obtient le résultat.

Notons S_{gen} la réunion disjointes des points génériques de S. Le schéma S_{gen} est alors la réunion disjointe de spectres de corps. Par suite, il existe une unique section $S_{gen} \to \mathrm{Isom}_{\mathcal{C}}(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2)$ induisant ϕ au-dessus de S_{gen}. Notons Z l'adhérence schématique de cette section dans $\mathrm{Isom}_{\mathcal{C}}(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2)$ (la structure de schéma étant la structure réduite). Il s'agit alors de voir que $Z \to S$ est un isomorphisme.

Comme $\mathrm{Isom}_{\mathcal{C}}(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2) \to S$ est fini et non ramifié, il en est de même de $Z \to S$.

Soit $s \in S$ et R un anneau de valuation dominant $_{S,s}$. Comme vu précédemment, on peut étendre l'isomorphisme à la fibre générique (donné par $Z \times_S \mathrm{Spec}\, R$) par normalisation. En particulier, on voit qu'il y a un unique point de Z au-dessus de s, et celui-ci est de même corps résiduel que s car la section de $\mathrm{Isom}_{\mathcal{C}}(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2)$ correspondante est obtenue par normalisation.

Par suite, l'application ensembliste $Z \to S$ est injective. Comme ce morphisme est non ramifié et propre, c'est une immersion fermée. Comme il est dominant et que S est réduit, c'est un isomorphisme. $\square$

En suivant la même preuve, on montre l'unicité de la compactification d'une courbe affine $\mathcal{D}$ lorsque celle-ci est de genre ≥ 2 dans le théorème 4.2.

Corollaire 4.5 *Soit S un schéma, $\mathcal{C} \to S$ un morphisme propre et lisse, $\mathcal{U} \subset \mathcal{C}$ le complémentaire d'un diviseur de Cartier relatif et $\mathcal{V} \to \mathcal{U}$ un morphisme étale. Supposons que*

i) les fibres géométriques de $\mathcal{V} \to S$ sont lisses et connexes ;

ii) il existe un entier g tel que pour tout point géométrique $\bar{s} \to S$, l'unique complétion lisse de $\mathcal{V}_{\bar{s}}$ est de genre g.

Alors il existe une altération $S' \to S$ et une unique *courbe propre et lisse $\mathcal{D} \to S'$ contenant $\mathcal{V} \times_S S'$ telle qu'on a un diagramme commutatif*

$$\begin{tikzcd} \mathcal{V} \times_S S' \arrow[r] \arrow[d] & \mathcal{D} \arrow[d] \\ \mathcal{U} \times_S S' \arrow[r] & \mathcal{C} \times_S S' \end{tikzcd}$$

Il est possible d'étendre de résultat dans le cas modéré quand on suppose que $\mathcal{C} \setminus \mathcal{U}$ est le support d'un diviseur de Cartier relatif étale sur la base (cf. §5). Le cas sauvage reste par contre difficile à maîtriser. À titre d'exemple, considérons un corps k non parfait de caractéristique p, $a \in k \setminus k^p$ et V le revêtement de $\mathbb{A}^1_k \setminus \{0\}$ donné par $y^p - y = \frac{a}{x^p}$. La normalisation de $\mathbb{P}^1$ dans le corps des fractions de V est donnée par $u^p - x^{p-1}u = a$ qui n'est pas lisse au-dessus de $x = 0$. Toutefois, il va exister une compactification lisse sur $k(\sqrt[p]{a})$.

Le corollaire ci-dessus est trivialement faux si S n'est pas réduit. En effet, les déformations infinitésimales de torseurs au-dessus d'un schéma affine sont toujours isomorphes alors qu'il existe en général des déformations infinitésimales de courbes propres qui ne sont pas isomorphes.

C'est ce phénomène qui explique que l'exemple ci-dessus ne peut pas se redescendre à k : l'anneau $k(\sqrt[p]{a}) \otimes_k k(\sqrt[p]{a})$ n'étant pas réduit, on ne peut pas utiliser l'unicité de la courbe pour redescendre la courbe lisse par descente finie plate.

4.2 Stratification de l'espace des torseurs

Soient S un schéma et $\mathcal{V} \to S$ une courbe lisse, non nécéssairement propre. Pour tout point $s \in S$, nous noterons $\mathfrak{g}_{\mathcal{V}}(s)$ le genre de l'unique compactification lisse de $\mathcal{V}_{\bar{s}}$, où $\bar{s}$ est un point géométrique au-dessus de s. Cet entier ne dépend en fait que de s et commute à tout changement de base $S' \to S$.

Proposition 4.6 *Supposons que S est un schéma noethérien, alors l'application $\mathfrak{g}_{\mathcal{V}} \colon S \to \mathbb{N}$ est constructible.*

Preuve : Comme l'image d'un ensemble constructible par un morphisme de schémas est constructible, on peut supposer que S est normal et intègre de point générique η. D'autre part, quitte à faire une extension finie de S, on peut supposer que $\mathcal{V}_\eta$ possède une compactification lisse (en général, cette extension est nécessaire). Choisissons une compactification $\mathcal{D} \to S$ de $\mathcal{V}$, qui existe d'après Nagata. En particulier, on peut la choisir normale, ce qui assure que la fibre générique de $\mathcal{D} \to S$ est lisse car on a supposé que $\mathcal{V}_\eta$ possède une compactification lisse, celle-ci est automatiquement $\mathcal{D}_\eta$.

D'après [EGA] Proposition IV.17.7.11, le lieu S' des points $s \in S$ où $\mathcal{D}_s \to \mathrm{Spec}\, k(s)$ est lisse est constructible, et il est aisé de voir que $\mathfrak{g}_{\mathcal{V}}$ est localement constant sur cet ensemble car c'est le cas de du genre de $\mathcal{D}$. On peut alors répéter cette construction sur $S \setminus S'$ qui est de codimension > 0. Comme S est noethérien, on obtient le résultat après un nombre fini d'étapes. $\square$

En particulier pour tout entier $g \in \mathbb{N}$ nous pouvons considérer le sous-schéma $S_{\mathfrak{g}_{\mathcal{V}}=g}$ composé des points s de S pour lesquels $\mathfrak{g}_{\mathcal{V}}(s) = g$. En effet, comme S est noethérien et $S_{\mathfrak{g}_{\mathcal{V}}=g}$ est constructible, ce dernier est une réunion d'ensembles localement fermés. On peut donc le munir d'une structure de schéma en considérant sa structure réduite. On prendra garde au fait que ce schéma ne commute pas au changement de base quelconque car la structure réduite n'a ici rien de canonique.

Dans les faits, nous devrons utiliser cette construction pour un groupoïde qui est limite inductive de champs algébriques noethériens. Le fait que ce soit un groupoïde ne pose pas de problème car l'application $\mathfrak{g}_{\mathcal{V}}$ commute aux changements de base. On généralise alors aisément la construction ci-dessus au cas de la limite inductive.

Nous donnons maintenant quelques propriétés de la différente.

Proposition 4.7 *Reprenons les notations précédentes et supposons S noethérien. Soient η un point de S et s une spécialisation de η. Alors $\mathfrak{g}_{\mathcal{V}}(s) \leq \mathfrak{g}_{\mathcal{V}}(\eta)$.*

Preuve : On peut supposer que S est le spectre d'un anneau de valuation discrète, les points η et s étant ses points génériques et fermés. Quitte à faire une extension

finie de S, on peut de plus supposer que les compactifications normales de chaque fibre sont lisses. Par suite, on peut choisir une compactification $\mathcal{D}$ de $\mathcal{U}$ telle que cette dernière est dense dans chaque fibre. Si on suppose de plus $\mathcal{D}$ normale alors il est Cohen-Macaulay (d'après le critère de Serre), et sa fibre spéciale est réduite. Il est alors aisé de montrer que la caractéristique d'Euler de la normalisée de la fibre spéciale est plus petite que la caractéristique d'Euler de la fibre spéciale. Cette dernière étant égale à la caractéristique d'Euler de la fibre générique par platitude, on obtient le résultat souhaité. $\square$

4.3 Un morphisme entre espaces de modules de courbes

Soient g un entier et G un groupe abstrait fini. Nous noterons $\mathcal{M}_g[G]$ l'espace des modules des courbes propres et lisses de genre g munies d'une action de G fidèle dans chaque fibre. Cet espace a été introduit par Tufféry dans [Tuf93] et a été étudié indépendemment pas plusieurs auteurs.

Soient $\mathcal{D} \to S$ une telle courbe et H un sous-groupe de G. Dans [Sam66], Samuel montre que le quotient $\mathcal{D} \to \mathcal{D}/H$ commute aux changements de base quelconques et que $\mathcal{D}/H \to S$ est une courbe propre lisse (voir aussi [BM04] pour une autre preuve). Par suite, le genre du quotient $\mathcal{D}/H$ est localement constant. Il est donc naturel de s'intéresser aux champs algébriques $\mathcal{M}_{g,g'}[H \subset G]$ des courbes propres et lisses de genre g telles que le quotient par H est de genre g'. On obtient ainsi une décomposition

$$\mathcal{M}_g[H \subset G] = \coprod_{g'} \mathcal{M}_{g,g'}[H \subset G]$$

en sous champs ouverts et fermés.

Dans la suite, nous fixerons un sous-groupe distingué $H \lhd G$ et noterons $\mathcal{M}_{g,g'}[H \lhd G]$ afin de conserver visuellement l'information.

La formation du quotient étant ici fonctorielle, on obtient un morphisme $\mathcal{M}_{g,g'}[H \lhd G] \to \mathcal{M}_{g'}[G/H]$ définit par $\mathcal{D} \to \mathcal{D}/H$.

Supposons que $\mathcal{D}/H$ est de genre g' et notons B le diviseur de branchement du morphisme quotient. On montre que c'est un diviseur de Cartier relatif sur $\mathcal{D}/H$ de degré $n = |H|((2g-2) - (2g'-2)|H|)$ te dont la formation commute aux changements de base.

Notons $\mathcal{M}_{g'}^{[n]}[G/H]$ l'espace des modules de genre g' munie d'une action de G/H fidèle dans chaque fibre, et d'un diviseur de Cartier relatif de degré n (cf. [Rom02] pour l'algébricité de ce champ).

D'après ce qui a été dit précédemment on a un morphisme

$$\begin{array}{rccc} \Phi\colon & \mathcal{M}_{g,g'}[H \lhd G] & \to & \mathcal{M}_{g'}^{[n]}[G/H] \\ & (\mathcal{D} \to S) & \mapsto & (\mathcal{D}/H \to S, B). \end{array}$$

L'espace tangent relatif de ce morphisme possède un interprétation simple en termes de déformations infinitésimales. Pour montrer cela, on utilise une généralisation du principe local-global (infinitésimal) de Bertin et Mézard obtenu dans [BM00]. En effet, soit k un corps, $D \to \mathrm{Spec}\, k$ une courbe propre et lisse munie d'une action fidèle de G et telle que le quotient $C := D/H$ soit de genre

g'. Notons $\pi\colon D \to C$ le morphisme quotient et $\mathrm{H}^i_G(D, \Omega^\vee_{D/k})$ la cohomologie équivariantes du faisceau tangent. On a une suite exacte provenant de la suite spectrale associée au foncteur dérivé de $\mathcal{F} \mapsto \mathrm{H}^0_{G/H}(D/H, \pi^H_* \mathcal{F}) = \mathrm{H}^0_G(D, \mathcal{F})$:

$$0 \to \mathrm{H}^1_{G/H}(D/H, \pi^H_* \Omega^\vee_{D/k}) \to \mathrm{H}^1_G(D, \Omega^\vee_{D/k}) \to \mathrm{H}^0_{G/H}(D/H, \mathrm{R}^1\pi^H_* \Omega^\vee_{D/k}) \to \\ \mathrm{H}^2_{G/H}(D/H, \pi^H_* \Omega^\vee_{D/k}) \to \mathrm{H}^2_G(D, \Omega^\vee_{D/k}).$$

Cette suite exacte a une interprétation très simple en termes de déformations. Le terme $\mathrm{H}^1_G(D, \Omega^\vee_{D/k})$ classifie les déformations G-équivariantes du premier ordre de D. Le terme $\mathrm{H}^0_{G/H}(D/H, \mathrm{R}^1\pi^H_* \Omega^\vee_{D/k})$ classifie certaines déformations H-équivariantes locales dont l'image doit être nulle dans $\mathrm{H}^2_{G/H}(D/H, \pi^H_* \Omega^\vee_{D/k})$ afin de définir une déformation globale.

Les termes $\mathrm{H}^i_{G/H}(D/H, \pi^H_* \Omega^\vee_{D/k})$ peuvent s'interpréter en terme de déformations G/H-équivariantes de C munie de son diviseur B. En effet, on a un morphisme canonique de faisceau $\pi^H_* \Omega^\vee_{D/k} \to \Omega^\vee_{C/k}$ qui est injectif et dont le conoyau $_B$ correspond au diviseur de branchement (avec multiplicité).

On a donc une suite exacte longue de cohomologie

$$\mathrm{H}^0_{G/H}(C, {}_B) \to \mathrm{H}^1_{G/H}(D/H, \pi^H_* \Omega^\vee_{D/k}) \to \mathrm{H}^1_{G/H}(C, \Omega^\vee_{C/k}) \\ \to \mathrm{H}^1_{G/H}(C, {}_B) \to \mathrm{H}^2_{G/H}(D/H, \pi^H_* \Omega^\vee_{D/k}) \to \mathrm{H}^2_{G/H}(C, \Omega^\vee_{C/k})$$

dans laquelle le terme $\mathrm{H}^1_{G/H}(C, \Omega^\vee_{C/k})$ correspond aux déformations G/H-équivariantes de C et $\mathrm{H}^2_{G/H}(C, \Omega^\vee_{C/k})$ correspond aux obstructions à la déformations G/H-équivariantes de C.

Finalement, le terme $\mathrm{H}^0_{G/H}(C, {}_B)$ correspond aux déformations équivariantes du diviseur de branchement.

On peut donc préciser l'espace tangent relatif du morphisme Φ.

Proposition 4.8 *L'espace tangent relatif du morphisme $\mathcal{M}_{g,g'}[H \lhd G] \to \mathcal{M}^{[n]}_{g'}[G/H]$ en un point correspondant à une courbe D s'identifie naturellement avec le noyau du morphisme*

$$\mathrm{H}^0_{G/H}(D/H, \mathrm{R}^1\pi^H_* \Omega^\vee_{D/k}) \to \mathrm{H}^2_{G/H}(D/H, \pi^H_* \Omega^\vee_{D/k}),$$

l'espace source classifiant les déformations locales H-équivariantes qui sont invariantes sous l'action de G/H.

En particulier, les déformations induites de B et de C sont nulles dans l'espace tangent relatif.

4.4 Lien avec un espace de torseur et rigidification

Considérons une courbe propre et lisse $\mathcal{D} \to S$ munie d'une action de G fidèle dans chaque fibre et notons B le diviseur de branchement du morphisme $\pi\colon \mathcal{D} \to \mathcal{D}/H$. Alors par définition le morphisme $\mathcal{D} \setminus |\pi^{-1}(B)| \to \mathcal{D}/H \setminus |B|$ est étale et est donc un H-torseur qui est invariant sous l'action de G/H d'après la proposition 2.2.

Notons $h : \mathfrak{C} \to \mathcal{M}_{g'}^{[n]}[G/H]$ la courbe universelle, $\mathfrak{B}$ le diviseur universel sur cette courbe et $\mathfrak{f}\colon \mathfrak{U} = \mathfrak{C} \setminus |\mathfrak{B}| \to \mathcal{M}_{g'}^{[n]}[G/H]$.

La construction ci-dessus définit un morphisme naturel

$$\mathcal{M}_{g,g'}[H \lhd G] \to [\mathrm{R}^1\mathfrak{f}_*H]^{G/H}.$$

D'autre part, comme H agit trivialement sur $[\mathrm{R}^1\mathfrak{f}_*H]$ par construction, on a une factorisation

$$\begin{tikzcd} \mathcal{M}_{g,g'}[H \lhd G] \arrow[r] \arrow[dr] & \mathcal{M}_{g,g'}[H \lhd G]/\!\!/H \arrow[d] \\ & {[\mathrm{R}^1\mathfrak{f}_*H]^{G/H}} \end{tikzcd}$$

où $\mathcal{M}_{g,g'}[H \lhd G]/\!\!/H$ désigne le 2-quotient obtenu en quotientant les schémas d'automorphismes par le sous-groupe distingué H (cf. [Rom02] §I.3 pour plus de précisions).

Si on regarde la restriction de ce morphisme à la caractéristique 0 alors on sait que $[\mathrm{R}^1\mathfrak{f}_*H]^{G/H}$ est représentable par un champ algébrique et on peut même montrer que le morphisme construit ci-dessus est une immersion fermée. Nous y reviendrons dans le paragraphe §5.

Notons $[\mathrm{R}^1\mathfrak{f}_*H]_G^{G/H}$ le sous-champs de $[\mathrm{R}^1\mathfrak{f}_*H]^{G/H}$ classifiant les H-torseurs $V \to U$ invariants sous G/H, qui sont géométriquement intègre sur S et tel que le groupe des automorphismes de $V \to U/(G/H)$ est G.

Théorème 4.9 *Il existe une altération* $X \to \left([\mathrm{R}^1\mathfrak{f}_*H]_G^{G/H}\right)_{\mathfrak{g}=g,red}$ *avec* X *réduit et un diagramme commutatif*

$$\begin{tikzcd} & X \arrow[dl] \arrow[d] \\ \mathcal{M}_{g,g'}[H \lhd G]_{red} \arrow[r] & \left([\mathrm{R}^1\mathfrak{f}_*H]_G^{G/H}\right)_{\mathfrak{g}=g,red} \end{tikzcd}$$

où $\mathfrak{g}$ *désigne le genre du torseur universel.*

Preuve : Oubliant l'action de G, c'est un corollaire de 4.5. Il s'agit alors de construire l'action de G. Toutefois, d'après la proposition 2.2, l'action de G existe sur les torseurs. On peut alors l'étendre grace au corollaire 4.4. □

Il est possible d'obtenir plus d'information sur ce morphisme dans certains cas particuliers. Pour fixer les idées, nous allons supposer que $H = G = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, le cas H plus général semblant difficile à atteindre.

Théorème 4.10 *Reprenons les notations ci-dessus et supposons que* $G = H = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ *avec* p *premier. Le morphisme canonique*

$$\mathscr{T}_{\lambda^p}(\mathfrak{f}) \tilde{\times}_{[\mathrm{R}^1\mathfrak{f}_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]} \left(\mathcal{M}_{g,g'}[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]/\!\!/H\right) \to \mathscr{T}_{\lambda^p}(\mathfrak{f})$$

induit une immersion fermée dont l'image est dans $(\mathscr{T}_{\lambda^p}(\mathfrak{f}))_{\mathfrak{g}=g}$.

Preuve : Considérons le morphisme

$$\mathscr{T}_{\lambda^p}(\mathfrak{f})\tilde{\times}_{[\mathrm{R}^1\mathfrak{f}_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]}\left(\mathcal{M}_{g,g'}[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]/\!/\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\right) \to \mathscr{T}_{\lambda^p}(\mathfrak{f}).$$

Par définition, un point $\mathrm{Spec}k \to \left(\mathcal{M}_{g,g'}[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]/\!/\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\right)$ induit un $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$-torseur dont le genre est g, et également un G-torseur. On obtient donc un morphisme

$$\left(\mathscr{T}_{\lambda^p}(\mathfrak{f})\tilde{\times}_{[\mathrm{R}^1\mathfrak{f}_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]}\left(\mathcal{M}_{g,g'}[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]/\!/\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\right)\right)_{red} \to \mathscr{T}_{\lambda^p}(\mathfrak{f})_{\mathfrak{g}=g}$$

Pour montrer que ce morphisme est une immersion fermée, nous allons vérifier les hypothèses de la proposition 4.1 (on prendra garde que les champs en présence sont en fait des limites de champs noethériens d'après la proposition 3.6).

Le premier point s'obtient en prenant la normalisation des torseurs définis sur un corps, ce qui donne automatiquement une courbe lisse de bon genre car on ne considère que des corps algébriquement clos.

Le point concernant les anneaux de valuations discrètes s'obtient en fait de la même manière modulo une altération *via* le corollaire 4.5 qui montre qu'on obtient bien une courbe lisse (voir aussi [SOS89], Lemma IV.2.3).

Il reste donc à voir la nullité de l'espace tangent relatif. Pour cela, on peut se placer au-dessus d'un point géométrique de $\mathcal{M}_{g'}^{[n]}$ de corps résiduel k.

Supposons que k est de caractéristique première à p. La description explicite de la proposition 4.8 permet de voir que l'espace tangent relatif du morphisme

$$\mathcal{M}_{g,g'}[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}] \to \mathcal{M}_{g'}^{[n]}$$

en le point considéré est nul car le terme $\mathrm{R}^1\pi_*^H$ est nul. Le résultat est donc évident.

Supposons maintenant que k est de caractéristique p. Suivant Harbater dans [Har80], on peut identifier $\mathscr{T}_{\lambda^p}(f)$ à $\frac{1}{x}k[\frac{1}{x}]$.

D'autre part, on peut remplacer l'espace tangent en un point de $\mathcal{M}_{g,g'}[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$ par la description explicite obtenue dans la proposition 4.8.

Finalement, le résultat provient de l'étude des déformations non obstruées obtenue par Pries dans [Pri02] Theorem 2.2.10 (description de $\mathcal{M}_\phi$). □

Remarque 4.11 Un analogue dans le cas $H \neq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ semble difficile à obtenir car l'étude de l'espace tangent est alors plus compliquée (le groupe H n'étant même pas *a priori* cyclique) et [Pri02] ne couvre que le cas $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rtimes \boldsymbol{\mu}_\ell$.

5 Espace des modules dans le cas modéré

Nous souhaitons appliquer les résultats des sections précédentes au cas modéré afin d'obtenir une description simple des espaces $\mathcal{M}_g[G]$. Pour cela, il convient tout d'abord de préciser quelques propriétés des actions modérées. La première concerne le diviseur de branchement, qu'on peut en fait remplacer fonctoriellement par un diviseur étale.

Lemme 5.1 *Soit S un schéma, G un groupe fini dont l'ordre est inversible sur S, $\mathcal{D} \to S$ une courbe propre et lisse munie d'une action de G fidèle dans chaque fibre. Notons $\pi\colon \mathcal{D} \to \mathcal{D}/G$ le morphisme quotient. Alors le conoyau de l'homomorphisme $\pi_*^G \Omega^\vee_{\mathcal{D}/S} \to \Omega^\vee_{\mathcal{C}/S}$ définit un diviseur de Cartier étale sur S et sa formation commute au changement de base.*

Preuve : Comme G est réductif sur S, la formation de $\pi_*^G \Omega^\vee_{\mathcal{D}/S}$ commute aux changements de base. Il s'ensuit que le conoyau est plat. Il s'agit alors de montrer qu'il définit un schéma étale sur S mais ceci peut se faire dans le cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos. Le calcul est alors direct. $\square$

Nous noterons B_r le diviseur ainsi obtenu, et le nommerons le diviseur de branchement *réduit*. En effet, un calcul explicite montre qu'il a même schéma sous-jacent que le diviseur de branchement classique, ce dernier étant en fait une puissance de B_r.

Donnons nous donc une courbe propre et lisse $h\colon \mathcal{C} \to S$ ainsi qu'une immersion ouverte $j\colon \mathcal{U} \to \mathcal{C}$ qui est le complémentaire de $\ell > 0$ sections disjointes.

Plaçons nous dans le cas où $G = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ pour un nombre premier p, et S est un $\mathrm{Spec}\mathbb{Z}[\zeta, \frac{1}{p}]$-champ, ζ désignant une racine primitive p-ième de l'unité. Il est alors possible de calculer complètement la plupart des termes de la suite (1).

En effet, par dualité de Poincaré (cf. [Mil80] Proposition VI.11.8) on a un isomorphisme canonique

$$\mathrm{R}^2 h_*(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}(-1).$$

Si on choisit un isomorphisme $\boldsymbol{\mu}_p \to \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ on peut construire un isomorphisme $h_*\mathrm{R}^1 j_*(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \to (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\ell$ qui ne dépend que du choix d'un ordre sur les sections et de l'isomorphisme $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to \boldsymbol{\mu}_p$. On peut donc réécrire cette suite exacte sous la forme

$$0 \to \mathrm{R}^1 h_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to \mathrm{R}^1 f_*\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}(-1))^\ell \to \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}(-1) \to 0$$

et cette suite ne dépend que de paramètres explicites.

Nous allons maintenant appliquer les résultats obtenus jusqu'à maintenant à l'étude de l'espace $\mathcal{M}_{g,g'}[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}] \times \mathrm{Spec}\mathbb{Z}[\zeta, \frac{1}{p}]$. On sait que ce champ algébrique est lisse sur $\mathrm{Spec}\mathbb{Z}[\zeta, \frac{1}{p}]$, il est donc réduit.

Pour étudier cet espace, il est commode d'en introduire un autre qui est un peu plus rigide. Notons $\ell := \frac{2g-2-p(2g'-2)}{p-1}$. On sait que si $\mathcal{M}_{g,g'}[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$ est non vide, alors d'après la formule de Hurwitz ce nombre est un entier (la réciproque est également vraie). On supposera donc que c'est le cas.

Notons $\mathcal{M}_{g,g'}[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]_\ell$ l'espace des modules des couples $(\mathcal{C} \to S, (e_1, \ldots, e_\ell))$ où $\mathcal{C} \to S$ est une courbe propre et lisse de genre g munie d'une action de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ fidèle dans chaque fibre, et les e_i sont des sections disjointes $S \to \mathcal{C}$ invariantes sous $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ telles que le lieu de ramification est précisément $\cup_i \mathrm{supp}(e_i)$. En oubliant les sections e_i, on obtient un morphisme

$$\mathcal{M}_{g,g'}[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]_\ell \times \mathrm{Spec}\mathbb{Z}[\zeta, \frac{1}{p}] \to \mathcal{M}_{g,g'}[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}] \times \mathrm{Spec}\mathbb{Z}[\zeta, \frac{1}{p}]$$

qui est un revêtement étale.

D'autre part, $\mathfrak{S}_\ell$ agit sur ce morphisme par permutation des e_i. Il est alors aisé de voir que le morphisme induit

$$\left(\mathcal{M}_{g,g'}[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]_\ell \times \mathrm{Spec}\mathbb{Z}[\zeta, \frac{1}{p}]\right)/\mathfrak{S}_\ell \to \mathcal{M}_{g,g'}[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}] \times \mathrm{Spec}\mathbb{Z}[\zeta, \frac{1}{p}]$$

est un isomorphisme.

Nous allons donc nous concentrer sur $\mathcal{M}_{g,g'}[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]_\ell \times \mathrm{Spec}\mathbb{Z}[\zeta, \frac{1}{p}]$ dans un premier temps.

Notons $\mathcal{M}_{g'}^\ell$ l'espace des modules des courbes de genre g' munie de ℓ sections disjointes, $\mathfrak{h} : \mathfrak{C} \to \mathcal{M}_{g'}^\ell \times \mathrm{Spec}\mathbb{Z}[\zeta, \frac{1}{p}]$ la courbe universelle, $e_1 \ldots, e_\ell$ les sections universelles et $\mathfrak{U}$ le complémentaire dans $\mathfrak{C}$ du support des e_i. Notons de plus $\mathfrak{f} : \mathfrak{U} \to \mathcal{M}_{g'}^\ell \times \mathrm{Spec}\mathbb{Z}[\zeta, \frac{1}{p}]$ le morphisme induit.

On sait que $[\mathrm{R}^1 f_* \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$ est représentable d'après la proposition 3.4, et en utilisant les mêmes techniques que pour la proposition 4.10, on montre aisément qu'on a un isomorphisme

$$\left(\mathcal{M}_{g,g'}[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]_\ell \times \mathrm{Spec}\mathbb{Z}[\zeta, \frac{1}{p}]\right) /\!\!/ (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \to [\mathrm{R}^1 f_* \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]_{\mathfrak{g}=g}.$$

Reprenons la suite exacte (3). Dans le cas où p est premier à toute les caractéristiques résiduelle et que la base contient une racine primitive p-ième de l'unité, les calculs obtenus en début de section peuvent alors être appliqués ici. On en déduit une suite exacte

$$0 \to [\mathrm{R}^1 \mathfrak{h}_* \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}] \to [\mathrm{R}^1 \mathfrak{f}_* \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}] \to (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\ell_{\mathcal{M}_{g'} \times \mathrm{Spec}\mathbb{Z}[\zeta, \frac{1}{p}]} \to \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}(-1)_{\mathcal{M}_{g'} \times \mathrm{Spec}\mathbb{Z}[\zeta, \frac{1}{p}]} \to 0.$$

Prenant en compte la condition $\mathfrak{g} = g$, on voit alors que l'espace

$$\left(\mathcal{M}_{g,g'}[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]_\ell \times \mathrm{Spec}\mathbb{Z}[\zeta, \frac{1}{p}]\right) /\!\!/ (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$$

est muni d'une action de $[\mathrm{R}^1 h_* \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$ et que le quotient s'identifie naturellement avec

$$\left\{(m_i) \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{0\})^\ell | \sum m_i = 0\right\}_{\mathcal{M}_{g'} \times \mathrm{Spec}\mathbb{Z}[\zeta, \frac{1}{p}]}.$$

Utilisant l'isomorphisme

$$\left(\mathcal{M}_{g,g'}[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]_\ell \times \mathrm{Spec}\mathbb{Z}[\zeta, \frac{1}{p}]\right)/\mathfrak{S}_\ell \to \mathcal{M}_{g,g'}[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}] \times \mathrm{Spec}\mathbb{Z}[\zeta, \frac{1}{p}]$$

on obtient alors la proposition suivante.

Proposition 5.2 *Le champ algébrique* $\left(\mathcal{M}_{g,g'}[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}] \times \mathrm{Spec}\mathbb{Z}[\zeta, \frac{1}{p}]\right) /\!\!/ (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ *est naturellement muni d'une action de* $[\mathrm{R}^1 h_* \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$ *et le quotient s'identifie avec*

$$\left(\left\{(m_i) \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{0\})^\ell | \sum m_i = 0\right\}/\mathfrak{S}_\ell\right)_{\mathcal{M}_{g'} \times \mathrm{Spec}\mathbb{Z}[\zeta, \frac{1}{p}]}$$

De plus, le morphisme quotient induit une bijection entre les composantes irréductibles des espaces de départ et d'arrivé.

Preuve : Seule la dernière assertion est à démontrer, elle provient de [Cor87] Remark 1. □

Comme $\mathcal{M}_{g'}^{\ell}$ est géométriquement irréductible, on a une description complète des composantes irréductibles de $\mathcal{M}_{g,g'}[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}] \times \mathrm{Spec}\mathbb{Z}[\zeta, \frac{1}{p}]$.

Dans le cas où p n'est pas premier, il est possible d'obtenir une description semblable. Les différences proviennent du calcul de la fonction $\mathfrak{g}$ ainsi que de l'irréductibilité des composantes.

Références

[BM00] J. Bertin and A. Mézard, *Déformations formelles des revêtements sauvagement ramifiés de courbes algébriques*, Invent. Math. **141** :1 (2000), 195–238.

[BM04] José Bertin and Ariane Mézard, *Problem of formation of quotients and base change*, Manuscripta Math. **115** :4 (2004), 467–487.

[Cor87] M. Cornalba, *On the locus of curves with automorphisms*, Ann. Mat. Pura. Appl. (4) **149** (1987), 135–151.

[dJ97] A. J. de Jong, *Families of curves and alterations*, Ann. Inst. Fourier (Grenoble) **47** :2 (1997), 599–621.

[DM69] P. Deligne and D. Mumford, *The irreducibility of the space of curves of given genus*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. :36 (1969), 75–109.

[EGA] A. Grothendieck, *Éléments de géométrie algébrique*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. **4, 8, 11, 17, 20, 24, 28, 32** (1961-1967).

[Gab81] Ofer Gabber, *Some theorems on Azumaya algebras*, The Brauer group (Sem., Les Plans-sur-Bex, 1980), Lecture Notes in Math., vol. 844, Springer, 1981, pp. 129–209.

[Gir71] J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*, Springer-Verlag, Berlin, 1971, Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Band 179.

[Gro68] A. Grothendieck, *Le groupe de Brauer. III. Exemples et compléments*, Dix Exposés sur la Cohomologie des Schémas, North-Holland, Amsterdam, 1968, pp. 88–188.

[Har80] D. Harbater, *Moduli of p-covers of curves*, Comm. Algebra **8** :12 (1980), 1095–1122.

[Kat86] N. Katz, *Local-to-global extensions of representations of fundamental groups*, Ann. Inst. Fourier (Grenoble) **36** :4 (1986), 69–106.

[Méz00] A. Mézard, *Fundamental group*, Courbes semi-stables et groupe fondamental en géométrie algébrique (Luminy, 1998), Progr. Math., vol. 187, Birkhäuser, Basel, 2000, pp. 141–155.

[Mil80] J. S. Milne, *Étale cohomology*, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1980.

[Pri02] Rachel J. Pries, *Families of wildly ramified covers of curves*, Amer. J. Math. **124** :4 (2002), 737–768.

[Rom02] M. Romagny, *Sur quelques aspects des champs de revêtements de courbes algébriques*, Thèse de doctorat, Université de Grenoble I, 2002.

[Sam66] P. Samuel, *Groupes finis d'automorphismes des anneaux de séries formelles*, Bull. Sci. Math. (2) **90** (1966), 97–101.

[Ser62] J. P. Serre, *Corps locaux*, Actualités Sci. Indust., No. 1296. Hermann, Paris, 1962.

[SOS89] T. Sekiguchi, F. Oort, and N. Suwa, *On the deformation of Artin-Schreier to Kummer*, Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) **22** :3 (1989), 345–375.

[Tuf93] S. Tufféry, *Déformations de courbes avec action de groupe*, Forum Math. **5** :3 (1993), 243–259.